

# 兒童與青少年何時需要接種疫苗？

年齡	HepB B型肝炎	DTaP/Tdap 白喉、破傷風、百日咳	Hib b型嗜血桿菌流感	IPV 小兒麻痺症	PCV13 肺炎球菌結合疫苗	RV 輪狀病毒	MMR 麻疹、腮腺炎、德國麻疹	Varicella 水痘	HepA A型肝炎	HPV 人口乳突病毒	MCV4 腦膜炎球菌結合疫苗	流行性感 冒 流感	
出生時	✓												
2個月	✓ (1-2個月)	✓	✓	✓	✓	✓							
4個月	✓ <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓							
6個月	✓ (6-18個月)	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ (6-18個月)	✓	✓ <sup>1</sup>						✓  (年滿6個月及以上的所有人每年秋季或冬季一劑。有些9歲以下的兒童可能需要兩劑；請詢問您子女的醫護提供者您的子女是否需要一劑以上。)	
12個月		✓ <sup>2</sup>	✓ (12-15個月)		✓ (12-15個月)	✓	✓	✓ (12-15個月)	✓ (12-15個月)	✓✓ (在12-23個月之間隔6個月注射兩劑)			
15個月													
18個月							補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>					
19-23個月	補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>		補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>					
4到6歲		✓		✓			✓	✓					
7到10歲		補種疫苗 <sup>3</sup>											
11到12歲		✓ (Tdap)		補種疫苗 <sup>3</sup>				補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	✓✓✓	✓	
13到15歲		補種疫苗 <sup>3</sup> (Tdap)									補種疫苗 <sup>3</sup>	補種疫苗 <sup>3</sup>	
16到18歲											補種疫苗 <sup>3</sup>	✓	

## 腳註

- 根據您的保健提供者使用的疫苗口型，您的嬰兒可能不需要這一劑。
- 這一劑DTaP最早可在12個月大時接種，只要前一劑已過了6個月即可。

- 如果您的子女延遲或錯過疫苗接種，請儘快讓子女接種。如果您的子女沒有準時完成一系列的疫苗接種，他或她只需要接種該系列剩下的疫苗。不需要重新開始。